

PARAMETRI VITALI DEL CANE

ANiFiT
ALL NATURAL



FREQUENZA CARDIACA | POLSO

- Misura il polso a livello dell'arteria femorale (parte interna della coscia, possibile su entrambi i lati).
- Il cane deve essere rilassato.
- Conta i battiti per 15 secondi e moltiplica il risultato $\times 4$.
- Il risultato indica il numero di battiti cardiaci al minuto.

Cane di taglia grande: 80–100 battiti al minuto

Cane di piccola taglia: 100–120 battiti al minuto

Cuccioli: fino a circa 210 battiti al minuto

Motivi di variazione: agitazione, attività fisica, età, temperatura, malattie cardiache/polmonari.



FREQUENZA RESPIRATORIA

- Controlla visivamente se il torace si solleva e si abbassa.
- Se non è possibile vederlo, appoggia delicatamente il palmo della mano sul torace e cerca di percepire il movimento.
- Se non senti nulla, avvicina la mano inumidita al naso del cane.
- Conta i respiri per un minuto.
- L'ansimare non è respirazione: non va contato.

Frequenza respiratoria media: 10–30 respiri al minuto.

Variazioni: frequenza respiratoria aumentata o rallentata, respirazione affannosa o superficiale oppure presenza di rumori. Osserva attentamente il cane e, se necessario, contatta il veterinario.



TEMPERATURA

- La misurazione viene effettuata nell'ano (utilizza vaselina).
- La temperatura corporea può variare in funzione della taglia e dell'età del cane. Nei cani anziani e di taglia grande tende a essere nella parte bassa dell'intervallo, mentre nei cani giovani e di piccola taglia tende a essere nella parte alta.

Cani adulti: 38,0 – 39,0°C

Cuccioli: una temperatura elevata fino a 39,5 °C è normale se non presentano altri segni di malattia e sono vivaci.

Panoramica:

37,5°	37,5°–39°	39°–40°	40°–41°	da 41°	da 42°
Ipotermia	Normale	Febbre / dopo attività fisica o agitazione	Febbre alta / pericolo di vita se prolungata	pericolo di vita! (se la febbre persiste)	Febbre acuta potenzialmente letale



MUCOSE

- La mucosa sana è rosa tenue, lucida e umida.
- Per il test, cerca una zona non pigmentata nella bocca (gengive o labbra).

Tempo di riempimento capillare (TRC):

- Premi brevemente un dito sulla mucosa (il sangue viene spinto fuori dai capillari).
- Togli il dito e osserva la zona.
- All'inizio è bianca perché non contiene sangue; dopo due secondi dovrebbe tornare a essere ben rosa.

Se non è così:

- Pallida: anemia, debolezza circolatoria, shock.
- Rosso scuro: febbre, possibile malattia infettiva, setticemia.
- Bluastro: carenza di ossigeno.
- Giallastro: problemi al fegato o alla bile, malattia del sangue, malattia infettiva.
- Secca/appiccicosa: perdita di liquidi.

IMPORTANTE: in presenza di una di queste anomalie chiama IMMEDIATAMENTE il veterinario!



CONTROLLARE L'EQUILIBRIO DEI LIQUIDI

- Solleva la pelle nella zona tra collo e spalle formando una piega.
- Lascia andare la piega: dovrebbe tornare immediatamente nella posizione normale. Se non lo fa, il cane è disidratato.
- Se la piega torna lentamente nella posizione normale, assicurati che il cane beva molto.
- Se la piega torna molto lentamente o non torna affatto, chiedi consiglio al veterinario. Potrebbe essere necessaria un'infusione.



SINTOMI DI SHOCK

I seguenti sintomi di shock possono comparire singolarmente o in combinazione e possono avere intensità diverse:

Sintomi

- Il cane appare debole e apatico.
- Movimenti incerti, andatura barcollante fino al collasso.
- Il cane trema come se avesse freddo.
- Le zampe, le orecchie e la punta della coda sono fredde.
- Le mucose sono pallide (tempo di riempimento capillare rallentato).
- Il battito cardiaco è accelerato, superficiale o irregolare.

IMPORTANTE: in caso di sospetto shock chiama IMMEDIATAMENTE il veterinario: È IN PERICOLO DI VITA!



SINTOMI IN CASO DI INTOSSICAZIONE

I sintomi di un'intossicazione possono essere diversi e avere intensità variabile a seconda della sostanza tossica e della sua concentrazione.

Sintomi

- Irrequietezza
- Vomito, eventualmente con consistenza schiumosa
- Diarrea
- Crampi
- Battito cardiaco irregolare
- Gengive pallide
- Difficoltà respiratorie
- Dimensione insolita delle pupille
- Sangue nelle urine
- Sangue nelle feci

Sintomi del dolore

- Schiena incurvata
- Tremori muscolari
- Segni di paralisi
- Aumento frequente della temperatura corporea
- Apatia
- Perdita di coscienza

IMPORTANTE: in caso di sospetto di intossicazione chiama IMMEDIATAMENTE il veterinario!

- Il cane non deve più muoversi. Tienilo tranquillo e trasportalo, in modo da limitare la diffusione della sostanza tossica.
- Nella maggior parte dei casi è possibile indurre il vomito entro 2 ore dall'ingestione.

Che cosa deve sapere il veterinario

- Quale sostanza tossica ha ingerito il cane?
- Quando ha ingerito la sostanza tossica?
- Quanto ne ha ingerito?
- Quali comportamenti anomali e quali sintomi presenta il cane?

I PARAMETRI VITALI DEL MIO CANE


Per poter riconoscere facilmente se il tuo cane sta bene o se qualcosa non va, è importante conoscere i parametri vitali del tuo cane sano. In questo documento ti abbiamo spiegato quali sono i parametri vitali e come misurarli.

Ora tocca a te:

Controlla i parametri vitali del tuo cane utilizzando questo documento e annotali nella tabella qui sotto. All'inizio puoi ripetere il controllo ogni 1-2 mesi. Da un lato acquisirai sempre più pratica, dall'altro il tuo cane si abituerà. In questo modo imparerai a conoscere meglio il tuo amico a quattro zampe e, in caso di emergenza, riconoscerai immediatamente eventuali variazioni dei parametri vitali. Queste informazioni sono importanti e utili anche per il veterinario.

Ti auguriamo di divertirti a conoscere meglio il tuo amico a quattro zampe.

Il tuo team ANiFiT



NOME DEL CANE: _____

PARAMETRO VITALE	DATA	VALORE MISURATO	OSSERVAZIONE
Respirazione			
Cuore / polso			
Tempo di riempimento capillare			
Mucosa orale			
Equilibrio dei liquidi, elasticità della pelle			
Temperatura corporea			
Stato di coscienza			
Fabbisogno di acqua potabile			